

AVERTISSEMENTS GRICOLES télécopiés

EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 283 (03/95) 23/02/1995

COLZA	: Pas de traitement charançons de la tige
	: Vol faible, captures non significatives
BLE	: Climat toujours très favorable aux maladies

COLZA

Stade C2 à E (entre nœuds visibles à boutons séparés).

Situation

CHARANCONS DE LA TIGE

Vol peu important, captures non significatives (8 pour 20 cuvettes sur l'ensemble de la région).

Les colzas vont bientôt atteindre le stade fin de sensibilité (stade tige 20 cm).

MELIGETHES

Le vol a débuté timidement le 10 février, pour s'intensifier légèrement la journée du 20. L'activité au champ est toujours très réduite.

PUCERONS CENDRES DU CHOU

Les premières colonies sont observables dans bon nombre de parcelles.

Préconisation

Le traitement spécifique charançon de la tige est inutile cette année.

Pour les méligèthes et les pucerons, reportez-vous au dossier Avertel, pages 12 et 13 pour les seuils d'intervention en fonction de la présence au champ.

Très rares, sont les parcelles qui méritent actuellement une intervention sur un de ces deux ravageurs.

Consultez la fiche produit si un traitement s'avère néanmoins nécessaire.

Quelqu'il en soit, intervenez toujours par journées douces et ensoleillées favorables à l'activité des insectes.

BLE

Stade redressement à épi 1 cm.

PIETIN-VERSE

Situation

De nouvelles contaminations se sont produites entre le 8 et le 17 Février. De plus, le cycle du piétin se déroule très rapidement et les contaminations secondaires sont maintenant bien engagées.

Des symptômes typiques sont observés sur gaines dans les parcelles à note de risque élevée (jusqu'à 20 %). Le risque climatique reste donc important cette année.

Préconisation

- Note supérieure à 14 : le piétin doit absolument être pris en compte dans la stratégie fongicide. Programmez une intervention spécifique, première semaine de mars si vous employez du prochloraz ou incluez du cyprodinil au stade 1-2 nœuds dans votre stratégie fongicide sur maladies foliaires.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Route de la Forêt 86580 BIARD
Abonnement annuel : 350 F TEL 49 58 39 02

Publication périodique
CPDAP n° 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4593

BnF
S&T

13405 40830

75

• Note inférieure à 14 : attendre un prochain avis pour intervenir.

OIDIUM

Situation

Pau développé, sauf sur variétés sensibles où l'on note un certain redémarrage.

Préconisation

Attendre un prochain avis.

ROUILLE BRUNE

Situation

Après une stagnation apparente de la maladie, des apparitions significatives de pustules sont à prévoir sur les semis réalisés avant le 20/11. Il s'agit toujours de la maladie la plus préoccupante. Nous confirmons les risques d'explosion en fonction des périodes de semis (bulletin n°282).

Préconisation

Attendre un prochain avis.